

CLINIC® SELECT

FICHE D'IDENTITÉ

USAGES

Dés herbage des zones cultivées et avant mise en culture : annuelles, bisannuelles et vivaces.
A.M.M. N° 21.00.102

DOSES HOMOLOGUÉES

- Dés herbage zones cultivées :
Annuelles : 3 L/ha,
Bisannuelles : 5 L/ha sauf Forêt 6 L/ha,
Vivaces : 6 L/ha sauf débroussaillage Forêt 7 L/ha.
- Avant mise en culture 3 L/ha
Traitement par taches.

COMPOSITION

Glyphosate : 360 g/L *équivalent acide*
(soit 480 g/L sel d'isopropylamine).

FORMULATION

Concentré soluble (SL).

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 L.

CLASSEMENT

Sans classement toxicologique.
N (R51/53) dangereux pour l'environnement.

PROFIL TECHNIQUE

EFFICACITÉ : ACTION SYSTÉMIQUE

Agit de la feuille aux racines.

TRÈS LARGE SPECTRE

Annuelles, bisannuelles et vivaces ;
Herbacées et ligneux ;
Graminées et dicotylédones.

SOLS PERMÉABLES

WOP - WATER OPTIMISED PROCESS

Process de fabrication innovant.

SOUPLESSE

Traitement possible de février à novembre, même en conditions estivales.

Délai avant pluie réduit : 1 heure



QUAND APPLIQUER ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

■ Optimum ■ Possible

CLINIC® SELECT, s'emploie de février à novembre, en période de végétation active, en dehors des périodes chaudes et en l'absence de gel, de rosée ou de menace de pluie (*délai avant pluie de 1 heure*).

- **au printemps**, CLINIC® SELECT détruit annuelles et bisannuelles hivernales ainsi que la plupart des vivaces.
- **en été**, il élimine les annuelles estivales (*amarantes, chénopodes, digitales, sétaires*). Il est souhaitable d'intervenir lorsque l'ensemble de la végétation est levée.
- **en automne**, en période de sève descendante, il est particulièrement actif sur vivaces (*chiendents, liserons, chardons, rumex*) ou pérennes (*ronces, potentilles*).



COMMENT APPLIQUER ?

USAGE	DOSES POUR 300 L DE BOUILLIE**		
	Adventices Annuelles	Adventices Bisannuelles	Adventices Vivaces
Avant mise en culture	3 L	-	-
Zones cultivées	3 L	5 L	6 L
Forêt	Dégagement	6 L	6 L
	Débroussaillage	-	7 L

** Mouillage 300 L/ha.

Dose maximale de glyphosate acide : 2200 g/ha/an

Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 m par rapport aux points d'eau.

1/ PRÉPARER

Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter.

- remplir au 1/3 la cuve d'eau claire avant de verser la dose exacte de CLINIC® SELECT,
- rincer 3 fois les emballages vides et verser l'eau de rinçage impérativement dans la cuve,
- compléter la cuve d'eau à la quantité de bouillie nécessaire, bien agiter.

L'utilisation de ZONEBLEU, colorant temporaire et d'un adjuvant ; incorporés dans la cuve ; permettent de visualiser et d'améliorer l'application.

2/ TRAITER

Traiter uniquement sur les adventices présentes sans toucher les parties vertes des plantes à préserver (*l'utilisation de lances munies d'un cache protecteur est recommandée*).

Traiter à basse pression (2 ou 3 bars maximum) avec des buses à fente (*jet plat*).

3/ NETTOYER

Après traitement, rincer soigneusement la cuve en actionnant la pompe afin de nettoyer aussi tuyauteries et buses.

Épandre l'eau de rinçage et les reliquats de bouillie conformément à la législation en vigueur, à l'écart de tout point d'eau et de cultures, si possible sur la zone déjà traitée. (*ne jamais vidanger dans un caniveau, un égout ou sur une surface imperméable*).

Si l'appareil est utilisé ultérieurement pour d'autres types de traitements (*dés herbage sélectif, insecticide, etc.*), il est impératif de bien le nettoyer.

Porter des gants appropriés pendant les phases de mélange/chargement et application pour une application avec un pulvérisateur à dos ou une lance.

CLINIC® SELECT

Pour cela, utiliser MEDIATOR® NET afin d'éliminer toutes traces de produit susceptible de provoquer des effets non intentionnels lors de la prochaine utilisation du matériel.

RECOMMANDATIONS

Respecter les recommandations d'emploi indiquées sur l'étiquette et prendre les précautions usuelles d'emploi des produits phytosanitaires.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
- Éviter toute formation d'embruns en traitant par temps calme surtout à proximité d'environnements sensibles, gazons, plantations, cultures, points d'eau, végétations spontanées que l'on désire conserver.
- Dans le cadre des bonnes pratiques d'utilisation, l'usage d'une part d'un adjuvant approprié possédant la mention « limitation de la dérive » et d'autre part d'un colorant temporaire de type ZONEBLEU est recommandé.
- En bordure de massifs de fleurs et pelouses, ménager une bande de sécurité non traitée de 20 cm.
- Éviter tout traitement à base de glyphosate sur les fossés en eau ou à proximité.
- Éviter de traiter à proximité des points d'eau, mares et cours d'eau.
- CLINIC® SELECT peut être associé à un herbicide à action de prélevée de notre gamme. Nous consulter pour plus d'information.
- Alternier ou associer des préparations à base de substances à modes d'action différents au cours d'une saison de traitements.

STOCKAGE

Conserver hors de portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons (y compris ceux pour animaux) et dans l'emballage d'origine, bien fermé, à l'abri du gel. Les locaux de stockage doivent être frais et ventilés.

EMBALLAGES VIDES



Réemploi interdit. Bien vider le bidon, le rincer 3 fois à l'eau claire et mettre l'eau de rinçage dans la cuve de traitement. Éliminer les emballages vides via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR ou un autre service de collecte spécifique. Se renseigner auprès de Nufarm pour connaître la société la plus proche de chez vous qui participe à cette collecte. Respecter la réglementation locale.

Sur simple demande, vous pouvez recevoir la **Fiche de Données de Sécurité** du produit, ou consultez notre site internet www.nufarm.fr

IMPORTANT

Respectez les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases les traitements en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture.

Nufarm s.a.s
28, boulevard Camélinat
BP 75 - 92233 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. 01 40 85 50 23
Fax 01 40 85 51 56

www.nufarm.fr



MODE D'ACTION

EFFICACITÉ

Process de fabrication innovant (WOP - Water Optimised Process), intégrant un traitement de l'eau afin d'augmenter la performance de la formulation (molécules de glyphosate non complexées aux ions Ca^{2+} et Mg^{2+} donc immédiatement disponibles). CLINIC® SELECT possède un **large spectre d'efficacité** sur adventices annuelles, bisannuelles et vivaces, dicotylédones ou graminées.

NOMS COMMUNS			DOSES
GRAMINÉES ANNUELLES			3 L/ha
Digitaires	Pâturin annuel	Sétaires	
Panic pied de coq		Ray grass italien	
VIVACES			8 L/ha
Chardons	Laiteron des champs	Potentille Rampante	
Chiendent Pied de Poule	Liserons	Ronces	
Chiendent Rampant	Mauves	Rumex	
Chondrilla à tête de jonc	Pissenlit	Sorgho d'Aleps	
Epilobes	Ray Grass anglais	Trèfles	
DICOTYLÉDONES ANNUELLES ET BISANNUELLES			6 L/ha
Amarantes	Gaillet	Picris	
Carotte	Géraniums	Plantains	
Chénopodes	Laiterons	Renoncules	
Coquelicot	Laitue scarole	Renouées	
Crépis	Lamier	Séneçons	
Erigerons	Mercuriale annuelle	Véroniques	
Erodium	Morelle noire		

Herbicide **foliaire systémique** à base de **glyphosate**, CLINIC® SELECT est uniquement absorbé par les parties vertes (*feuillage et tiges vertes*) et transporté jusqu'à l'extrémité des racines ou rhizomes.

Le glyphosate bloque la synthèse des acides aminés impliqués dans la croissance et la respiration, au niveau de tous les organes de réserve de la plante (*feuilles, rhizomes, bulbés, etc.*).

CLINIC® SELECT assure ainsi la destruction complète des organes aériens et souterrains des adventices.

Les symptômes sont visibles rapidement notamment chez les graminées, au bout d'une semaine.

CLINIC® SELECT est sans action par le sol et n'a pas de persistance d'action.

SÉLECTIVITÉ

Par son mode d'action, CLINIC® SELECT peut être appliqué à l'aplomb des arbres et arbustes à condition d'éviter la projection d'embruns sur le feuillage, les bois verts ou les plaies non cicatrisées (*utiliser un cache protecteur*).

CLINIC® SELECT est donc adapté :

- au désherbage des massifs d'arbres et d'arbustes,
- à la préparation des terrains avant plantation ou semis,
- à la destruction de gazons dégradés avant renouvellement.

Plantations ou semis possibles 1 semaine après le traitement.

VOTRE CONTACT

